

Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции Новосибирск - Главный открытого акционерного общества «Российские железные дороги»



ПРИКАЗ

г. Новосибирск

26.07.2019

№ 546

О внесении изменений в Правила подготовки к диагностическим исследованиям в НУЗ ДКБ на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД», утвержденные приказом НУЗ ДКБ №427 от 07.06.19

Для улучшения качества проводимой подготовки к диагностическим исследованиям в НУЗ ДКБ на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в наименование исследований в соответствии с преискурантом: вместо «фибροколоноскопия» и «фибροколоноскопия с плановой полипэктомией» изложить в редакции «колоноскопия», «колоноскопия с плановой полипэктомией» соответственно.
2. Изложить Правила подготовки к ректороманоскопии, ректороманоскопии с плановой полипэктомией, колоноскопии, колоноскопии с плановой полипэктомией в редакции в соответствии с Приложением.
3. Заведующих подразделениями ознакомить сотрудников с изменениями утвержденных Правил, принять к руководству и использовать в работе, контролировать соблюдение правил.
4. Заместителям директора по терапевтической помощи Н.А. Андрюшиной, хирургической помощи Е.А. Береговому, поликлиническому разделу работы Г.Ф. Нотову обеспечить и контролировать соблюдение правил.
5. Начальнику сервисной службы М.А. Кубандыкову внести изменения в речевые модули Стандартов сервисной службы, сайт med54.ru и другие электронные ресурсы НУЗ ДКБ на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД».
6. Заведующей канцелярией Е.А. Викуловой ознакомить причастных в соответствии с листом ознакомления.
7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по медицинской части Л.П. Плуталову.

Директор

Юшков Е.Г.

Исп. Литвиненко П.И.
2-39-43

Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Исследование	Противопоказания к исследованию	Предварительная подготовка	Примечание
Ректороманоскопия, ректороманоскопия с плановой полипэктомией.	Сердечно легочная недостаточность в ст. декомпенсации.	<p>За 3 дня до исследования исключить из рациона черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, ягоды (варенье), орехи, семечки и зелень, газированные напитки и другие продукты, индивидуально вызывающие газообразование. Разрешено употреблять курицу, рыбу, мясо (отварное), молочные продукты (кроме йогуртов с фруктами и ягодами), буллоны, каша рисовая, манная, хлеб белый (или сухарики), макароны, яйца (омлеты).</p> <p>Прекратить приём препаратов содержащих железо, активированный уголь, висмут.</p> <p>Способы подготовки кишечника (выбрать один):</p> <p>1. После легкого обеда применять слабительный препарат, содержащий макрогол (например, Фортранс, или Лавакол, или Мовипреп), способ применения которого детально описан в инструкции и зависит от времени, на которое назначено исследование. При выборе слабительного средства Эзиклен рекомендуется дополнительный прием жидкости, объем жидкости и способ применения детально описаны в инструкции, прием зависит от времени, на которое назначено исследование. При выборе</p>	<p>Иметь с собой:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. направление лечащего врача 2. результаты предыдущих исследований. 3. для плановой эндоскопической полипэктомии иметь при себе результаты исследований: <ul style="list-style-type: none"> - Общий анализ крови с определением тромбоцитов - Общий анализ мочи - Анализ крови на сахар, АЛТ, АСТ, билирубин, мочевины, креатинин, общий белок, ПТИ, ЧТВ, МНО - Маркеры гепатитов В и С - Маркеры ВИС (действительные в течение 30 дней) - РМП+ИФА (на сифилис) - Группа крови и резус-фактор - Электрокардиография - Флюорография легких

<p>Колоноскопия, колоноскопия с плановой полипэктомией</p>	<p>Сердечно - легочная недостаточность в ст. декомпенсации. Противопоказано исследование при острых инфекционных болезнях, перитоните, а также в поздних стадиях сердечной и легочной недостаточности, выраженных нарушениях свертывающей системы крови.</p>	<p>слабительного препарата Фосфо-сода за сутки до процедуры необходимо воздержаться от приёма пищи и принять препарат согласно инструкции. 2. Накануне исследования необходимо произвести очистку кишечника с помощью клизм (Кружка Эсмарха), в количестве 2 клизм утром и 2 клизм вечером.</p>	<p>(действительна в течение года) - Результаты последнего эндоскопического и гистологического исследований - Заключение терапевта</p>
		<p>Диета. За три дня до исследования исключить из рациона овощи, фрукты (в том числе сухофрукты), ягоды (варенье), черный хлеб, бобовые, мак, орехи, семечки и зелень. Разрешено употреблять курицу, рыбу, мясо (отварное), молочные продукты (кроме йогуртов с фруктами и ягодами), бульоны, каша рисовая, манная, хлеб белый (или сухарики), макароны, яйца (омлеты). В третий день диеты только жидкая пища (манная каша, кисель, бульоны), до 13:00. Прекратить приём препаратов содержащих железо, активированный уголь, висмут. Все три дня необходимо принимать слабительные препараты, однократно, перед сном, по инструкции, в минимальной дозе (исключение - пациенты с хроническим или профузным поносом). Способы подготовки кишечника (выбрать один). 1. После легкого обеда применять слабительный препарат, содержащий макрогол (например, Фортранс, или Лавакол, или Мовипрел), способ применения которого детально описан в инструкции и зависит от времени, на которое назначено исследование.</p>	<p>Иметь с собой: 1. Направление лечащего врача 2. результаты предыдущих исследований 3. для плановой эндоскопической полипэктомии иметь при себе результаты исследований: - Общий анализ крови с определением тромбоцитов - Общий анализ мочи - Анализ крови на сахар, АЛТ, АСТ, билирубин, мочевины, креатинин, общий белок, ПТИ, АЧТВ, МНО - Маркеры гепатитов В и С - Маркеры ВИЧ - РМП+ИФА (на сифилис) - Группа крови и резус-фактор - Электрокардиография (не позднее чем 2 недели назад) - Флюорография легких</p>

При выборе слабительного средства Эзиклен рекомендуется дополнительный прием жидкости, объем жидкости и способ применения детально описаны в инструкции, прием зависит от времени, на которое назначено исследование. При выборе слабительного препарата Фосфо-сода за сутки до процедуры необходимо воздержаться от приёма пищи и принять препарат согласно инструкции.

В случае проведения процедуры с внутривенной седацией прием препарата должен быть закончен накануне исследования за 4 часа до его проведения.

2. Накануне исследования, в 14.00 необходимо принять 30 мл. касторового масла, либо в форме капсул, 30 шт. С 18.00 необходимо начать подготовку с помощью очистительных клизм (Кружка Эсмарха), в количестве 4 штук, до чистой воды. Утром, перед исследованием необходимо повторить процедуру очистки с помощью клизм, не менее 4 штук, до чистой воды. В случае хронических запоров количество клизм увеличить до 5-7 штук.

(действительна в течение года)

– Результаты последнего эндоскопического и гистологического исследований

– Заключение терапевта